

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/glava-diploma/117512>

Тип работы: Глава диплома

Предмет: Акушерство

-

2. Анализ и статистика неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов

2.1. Анализ наблюдений женщин неспецифическими воспалительными заболеваниями женских половых органов в женской консультации.

С целью изучения динамики уровня и структуры заболеваемости органов репродуктивной системы по обращаемости проводились выкопировка данных и анализ сведений, полученных из первичной медицинской документации: медицинская карта амбулаторного больного, форма 025/у-04; талон амбулаторного пациента, форма № 025-12/у.

В процессе анализа определена динамика структуры обращений по поводу воспалительных заболеваний женской половой сферы.

Структура обращений в 2019 году представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Структура обращений женщин с неспецифическими воспалительными заболеваниями женских половых органов за 2019 г

Процентное соотношение часто встречающихся неспецифических заболеваний женских половых органов представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Часто встречающиеся неспецифических заболеваний женских половых органов

Неспецифические воспалительные заболевания женских половых органов чаще встречаются у женщин детородного возраста. По данным литературы ежегодно 1-2% женщин, живущих половой жизнью, заболевают вагинитами, сальпингоофоритами, эндометритами и параметритами различной этиологии. Предполагается, что к 2030 году каждая из двух женщин, достигшая 25-30-летнего возраста, перенесёт острое воспалительное заболевание женских половых органов и будет длительно наблюдаться у гинеколога.

Распределение женщин по возрасту представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Заболеваемость женщин в зависимости от возраста

Анализ рисунка 2 показывает, что неспецифические воспалительные заболевания чаще развиваются у женщин молодого возраста 49,7% пациенток составляют женщины в возрасте 20-30 лет. Чем старше женщина, тем реже возникают у нее неспецифические воспалительные заболевания женских половых органов.

Если сопоставить полученные данные с распределением опухолевых заболеваний в зависимости от возраста, то получим обратно пропорциональную зависимость – частота опухолевых заболеваний у женщин с возрастом увеличивается.

Определенная роль в развитии неспецифических воспалительных заболеваний принадлежит семейному статусу. Так, среди женщин, состоящих в официальном браке, процент развития воспалительных заболеваний несколько ниже. Выявлено также значительное влияние на частоту возникновения воспалительных неспецифических заболеваний тяжелых условий труда и труда во вредных условиях. Риск развития неспецифических воспалительных заболеваний увеличивает занятость женщин в сверхурочные и ночные часы.

Отрицательное влияние курения на репродуктивные органы женщин не вызывает сомнения, что подтверждает проведенное исследование. Так, процент курящих женщин составил в группе пациенток с неспецифическими воспалительными заболеваниями 41,3%.

Процент женщин, злоупотребляющих алкоголем, в группе пациенток с неспецифическими воспалительными заболеваниями женских половых органов составил 3,85%, однако считать достоверным этот показатель нельзя. Риск возникновения неспецифических воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы значительно возрастает аз при употреблении наркотических средств и злоупотреблении алкоголем.

Существенное влияние на развитие неспецифических воспалительных заболеваний оказывают инфекции, передающиеся половым путем, или так называемые «скрытые» инфекции.

По данным литературы, возбудителями неспецифических воспалительных заболеваний являются патогенные и условно-патогенные микроорганизмы (рисунок 3).

-

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/glava-diploma/117512>