

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/213267>

Тип работы: Реферат

Предмет: География

Введение 2

1. Заселение Камчатки 3

2. Богатства Камчатки 5

3. Вулканы 6

4. Животный мир Камчатки 7

5. Достопримечательности Камчатки 7

6. Климат полуострова Камчатка 9

7. Почвенно-растительный покров Камчатки 12

Заключение 15

Список литературы 16

Леса Камчатки не похожи ни на сибирскую тайгу, ни на лиственные леса европейской части России. Они образуют совершенно самостоятельный лугово-лесной зональный тип растительности, в котором преобладают каменно-березовые леса. Каменная береза образует чистые редко хвойные, так называемые «парковые леса» на огромной площади. На морском берегу или на верхней границе леса в горах их сменяет каменно-березовый лес из низкорослых деревьев с причудливо изогнутыми стволами и ветвями.

Хвойные леса, которые в древние геологические эпохи покрывали большую площадь Камчатки, были в значительной степени уничтожены во время оледенения и сохранились в основном на территории Центрально-Камчатской низменности. Флора Камчатки. Здесь, как примесь к хвойным лесам, произрастают осина, береза белоствольная, рябина сибирская. На восточном побережье, недалеко от устья реки Семячик, есть небольшой участок темнохвойного леса, образованный сахалинской елью.

Более разнообразными по набору древесных пород являются пойменные леса, где встречаются ольха, тополь, чозения, несколько видов ив. В кустарниковом ярусе лесов встречаются рябиновая бузина, кедровая и ольховая бузина, жимолость, шиповник, рябина, можжевельник.

На склонах гор в субальпийском поясе преобладают кедровый и ольховый стланики, образующие непроходимые заросли. Их сопровождают более короткие кустарники: золотистый и камчатский родендрон, тавога, полярная ива.

Одним из растительных сообществ, характерных для Камчатки, являются заросли грубой травы, часто достигающие 3 м в высоту. Они обычно располагаются по долинам рек и ручьев, в оврагах, по склонам в местах близкого расположения грунтовых вод. Чаще всего в них преобладают камчатский лабурнум, шерстистый борщевик (шеломайник), лесная морковь, коноплеволистный крестовник и др.

В растительном покрове Камчатки преобладает древесная и кустарниковая растительность, на долю которой приходится 68 % всей территории региона. 25 % занимают болота, тундра, луга. Горные пустыни и ледники занимают 7 % территории.

1. Глушкова В.Г. Экономика природопользования // В.Г. Глушкова, С.В. Макар – М.: 2005, 448 с.
2. Степаницкий В.Б. Экологический туризм на особо охраняемых природных территориях России: проблемы и перспективы // В.Б. Степаницкий – М.: Экотур, 2002.
3. Шубин В.Г. Особенности пребывания туристов на территории Камчатской области // В.Г. Шубин – М.: 2000.
4. Дроздов Н.Н. Рекреационные ресурсы Камчатки // Н.Н. Дроздов – М.: 2004.
5. Бабаев А.Г. Камчатский полуостров // А.Г. Бабаев – М.: 2004.
6. Алексеева Т.И. Географическая среда и биология человека // Т.И. Алексеева – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012, 432 с.
7. Быкасов В.Е. Проблемы охраны и рационального использования природы Камчатки // В.Е. Быкасов – М.: 2012, 500 с.
8. Лобков Е.Г. Основные сведения о фауне и животном населении (заповедников) // Е.Г. Лобков – М.: Академия, 2012, 355 с.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/213267>