

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/298362>

Тип работы: Реферат

Предмет: Медицина

СОДЕРЖАНИЕ

1	Определение понятий	2
2	Виды, классификация	3
2.1	Классификация гидроцефалии	3
2.2	Классификация микроцефалии	4
3	Клинические проявления	5
3.1	Клинические проявления гидроцефалии	5
3.1.1	Клиническая картина гидроцефалии у младенцев	5
3.1.2	Клиническая картина гидроцефалии у детей старше 2 лет	6
3.1.3	Клиническая картина гидроцефалии у взрослых	6
3.1.4	Течение гидроцефалии	7
3.2	Клинические проявления микроцефалии	8
3.2.1	Клиника наследственной (истинной) формы микроцефалии	8
3.2.2	Клиника вторичной формы микроцефалии (экзогенной)	9
	Список литературы	10

1 Определение понятий

Гидроцефалия (водянка головного мозга) - неуклонно прогрессирующее полиэтиологическое состояние, проявляющееся аномальным увеличением объема ликворных пространств мозга (в первую очередь желудочков мозга), повышенным внутричерепным давлением. Обусловлена расстройствами циркуляции цереброспинальной жидкости и дисбалансом между его секрецией и резорбцией. Это может происходить по причине сдавления опухолями мозга ликворных путей или их прорастания в желудочковую систему мозга. Морфологические признаки - расширение полостей желудочков, истончение вещества мозга, атрофия сосудистых сплетений, уплотнение паутинной оболочки, сращение мозговых оболочек. Извилины мозга уплощены, борозды сглажены, кровеносные сосуды уменьшены, деформированы. Кости черепа истончены, основание его уплощено. Клинически постоянным признаком является прогрессирующее увеличение головы. Череп увеличивается во всех направлениях, преимущественно выступают лобные бугры.

Микроцефалия (синдром Джакомини) - недоразвитие головного мозга, проявляющееся при рождении уменьшением его массы и размеров. Обычно сочетается с уменьшением окружности головы и микрокранией (отставанием роста мозгового черепа). Швы длительно остаются открытыми, кости черепа утолщены, в них рано формируются диплоидные каналы, внутричерепное давление не повышено. Морфологический признак микроцефалии - недоразвитие и неправильное строение больших полушарий при сравнительно нормальной архитектонике мозжечка и ствола мозга. Ребенок с микроцефалией обычно отстает в интеллектуальном и психическом развитии, страдает нарушением двигательных функций, судорожным синдромом.

2 Виды, классификация

2.1 Классификация гидроцефалии

По признаку проходимости ликворных путей:

1. Оклюзионная (закрытая).

Список литературы

1. Петрухин А. С. Детская неврология : учебник : в 2 т. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2012, - Т. 2. - 560 с. 2012.
2. Гидроцефалия : учебное пособие / А.И. Мидленко, О.Г. Семенов, М.А. Мидленко, С.Ю. Рябов, Е.Ю. Котова. - Ульяновск : УлГУ, 2015. - 67 с.

3. Бадалян Л.О. Детская неврология. - 3-е изд. - М.: Медицина, 1984.
4. Бадалян Л. О. Невропатология : учебник для студ. высш. учеб.заведений / Л. О. Бадалян. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательский центр «Академия», 2006.
5. С.И. Козлова, Н.С. Демикова, Е.Семанова, О.Е. Блинникова. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование. Атлас-справочник. Изд. 2-е, дополн. - М.: Практика, 1996
6. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений. - М.: Издательский центр «Академия», 2002.

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/referat/298362>